众志成城 防控疫情 爱岗敬业 守土有责

四川省执业药师协会
SICHUAN LICENSED PHARMACISTS ASSOCIATION

成都市医药商会
CHENGDU MEDICINE CHAMBER OF COMMERCE

联合推荐

四川省执业药师协会社会药房药学服务专委会
SICHUAN COMMITTEE OF PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY
收集整理

2020新冠肺炎疫情防控零售药店工作指导系列之

消毒防护及储备管理

资料来源：中国药学会《新型冠状病毒感染：零售药店工作指导与防控策略专家共识（第一版）》
图文信息：据药葫芦娃网络图文整理

消毒防护及储备管理

一、零售药店常见物品如何消毒？

公共区域物品

消毒公共区域经常使用或触摸的物体表面


电脑键盘
鼠标
收银台
电话
门把手
文具
桌椅

频率：每隔2小时消毒一次


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2小时

消毒剂：用75%酒精或
5000mg/L过氧乙酸

75%
酒精
或
5000mg/L
过氧乙酸

医疗仪器


额温枪
耳温枪
75%
酒精
酒精

擦拭消毒
有污染立即处理

大型设施


货架
售药处
空调
收银台
更衣柜
每日擦拭1次


5000mg/L
过氧乙酸
或
500mg/L
84消毒液

工作服

工作服、工作裤
等衣物

方法一：热洗涤方式消毒



消毒温度
75°C

浸泡时间≥30分钟

或



消毒温度
80°C

浸泡时间≥10分钟

* 可根据脏污程度的需要
而延长消毒时间

方法二：使用衣物消毒剂


浸泡
250~500mg/L
84消毒液



浸泡30分钟

频率：① 每周2次

② 有污染立即处理


2次
2次
2次
2次
第一周
第二周
第三周
第四周

清洁用具



① 必须分区域



卫生间



货架



冰箱



红色抹布



绿色抹布



蓝色抹布

② 每次用后清水冲净


500mg/L
含氯制剂

消毒液
浸泡


浸泡30分钟
清水冲净
晾干待用

二、如何进行日常空气消毒？

加强空气流通



频率：每日2次


1次
2次
9:00
17:00


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

每次通风30分钟

空气消毒机消毒

❶ 有空气消毒设备

空气质量：

通风条件：

室内是否有人：



使用空气消毒机

❷ 无空气消毒设备

按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）处理

定期

☑ 清洗

☑ 消毒



紫外线消毒

室内无人时使用紫外线消毒



频率：每日1～2次


1次
2次
9:00
17:00


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

照射时间
每次≥30分钟

喷雾消毒

无空气消毒设备时
采用

喷药量：20~30 mL/m^3

消毒期间：关门/窗

消毒完毕：充分通风


500mg/L
含氯消毒剂
或
5000mg/L
过氧乙酸


1小时
12
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

通风≥1小时
才能使用

三、如何对地面、墙壁、电梯等消毒？

有肉眼可见污染物

用一次性吸水材料
完全清除污染物后
消毒





无明显污染物：用消毒液消毒


含氯消毒剂
或
过氧乙酸
消毒液

500~1000mg/L

1000mg/L

药量200~300mL/m^2

频率：每日1~2次


1次
2次
9:00
17:00



先由外向内



再由内向外

四、环境消毒的注意事项有哪些？

① 认真阅读使用说明书


说明书
消毒方式
浓度
作用时间
说明书

② 配制和使用消毒剂应注意个人防护，佩戴手套和护目镜





3 消毒后用清水擦拭，防止对物品造成损坏



4 清洁工具应专室专区专用



5 可复用物品


含氯消毒剂
浸泡消毒后
含氯消毒剂
浸泡消毒后

清水清洗
干燥保存

6 氯已定不能灭活新型冠状病毒


氯己定
氯己定
新型冠状病毒

五、消毒剂储备管理有哪些要点？

酒精的储存方法


避光
通风
阴凉
密封
沙箱
沙箱
专用场地
酒精


热源
电器开关
火源
玻璃瓶装存
温度<30°C
潮湿

84消毒液的储存方法


✓ 密封
✓ <25°C
✓ 避光
○ 保质期1年
84
84


同放
酒精
84
酒精
84
分置

过氧乙酸的储存方法

远离
火源光照



储存于有冷藏装置、
通风散热良好、不燃结构的库房内


5000mg/L
过氧乙酸

泄露应急处理
设备和收容材料



温度<30℃



湿度<80%

采用
防爆型照明

防震动、
撞击和摩擦

禁止使用
易产生火花的设备



与还原剂、碱类、
金属盐类分开存
放，切忌混储




5000mg/L
过氧乙酸



易燃



易爆

易挥发



存放地点应配备随手可及的灭火器材和灭火设施（如沙、干粉灭火器、锹、桶等）

六、废弃物管理要注意什么?





- 丢进废弃口罩、手套专用垃圾箱





- 使用5%的84消毒液

- 喷洒进行消毒处理



- 无消毒液时，可将废弃口罩用密封袋或保鲜袋密封后丢弃

- 密封袋及垃圾袋需标注“废弃口罩/手套”


废弃手套
废弃口罩
专用垃圾箱

四川省执业药师协会
SICHUAN LICENSED PHARMACISTS ASSOCIATION

成都市医药商会
CHENGDU MEDICINE CHARMBER OF COMMERCE